

Nutrilon: een passende voeding voor elke baby

Erste keuze na borstvoeding voor gezonde baby's



Nutrilon Volledige Zuigelingenvoeding en Opvolgmelk

Onze unieke samenstelling

- Geavanceerde prebiotische vezelmix scGOS:lcFOS 9:1 met HMO 3'GL
- Postbiotica, dankzij ons unieke fermentatieproces (Lactofidus™)
- Naast DHA ook AA in eenzelfde ratio als in moedermelk*

De bewezen effecten van Nutrilon:

- Darmmicrobiota meer in lijn met dat van borstgevoede kinderen^{1,2}
- Minder infecties waarbij antibiotica nodig is³⁻⁵
- Minder maag-darm infecties^{3,4,6}

Nutrilon 1: vanaf de geboorte tot 6 maanden

Nutrilon 2: vanaf 6 tot 10 maanden

Nutrilon 3: vanaf 10 tot 12 maanden



Nutrilon DuoBalans

Onze meest geavanceerde formule Speciaal ontwikkeld om te combineren met borstvoeding

- Onze meest geavanceerde prebiotische vezelmix scGOS:lcFOS 9:1 met HMO 3'GL én HMO 2'FL
- Melkvet met bèta-palmitaat
- Postbiotica, dankzij ons unieke fermentatieproces (Lactofidus™)
- Naast DHA ook AA in eenzelfde ratio als in moedermelk**

De bewezen effecten van Nutrilon DuoBalans:

- Minder infecties waarbij antibiotica nodig is³⁻⁵
- Minder maag-darm infecties^{3,4,6}
- Minder luchtweginfecties^{4,7}
- Zachtere ontlasting meer in lijn met die van borstgevoede baby's^{8,9}
- Minder kans op krampjes^{2,10}

DuoBalans 1: vanaf de geboorte tot 6 maanden

DuoBalans 2: vanaf 6 maanden



Nutrilon Content

Bij onvoldoende verzadiging

- Caseïne:wei-eiwitverhouding 80:40 (Content 1) en 65:35 (Content 2) voor een minder snelle maaglediging (Content 2) en een langer verzadigd gevoel¹¹
- Bevat de geavanceerde mix van prebiotische vezels scGOS:lcFOS 9:1
- Bevat aardappelzetmeel en rijstbloem (Content 2)

Content 1: vanaf de geboorte tot 6 maanden

Content 2: van 6 tot 12 maanden

Baby's met specifieke klachten



Nutrilon Omneo

Dieetvoeding bij krampjes en/of moeizame ontlasting

- Bewezen effectieve dieetvoeding bij krampjes en moeizame ontlasting, al verbetering na 1 week^{12-14, 16}
 - ✓ 70% vermindering van huiltjesepisodes
 - ✓ 4x vaker ontlasting
 - ✓ 70% verbetering van maag-darmklachten
 - ✓ 91% van de ouders en 95% van de artsen melden een positief effect
- Bevat een unieke combinatie van ingrediënten:
 - β-palmitaat
 - Geavanceerde prebiotische vezelmix scGOS:lcFOS 9:1
 - Partieel eiwhydrolysaat
 - Zetmeel
 - Verlaagd lactosegehalte

Omneo 1: vanaf de geboorte tot 6 maanden

Omneo 2: van 6 tot 12 maanden



Nutrilon A.R.

Dieetvoeding bij spugen (anti-regurgitatie) Bewezen effectieve dieetvoeding bij spugen (regurgitatie)

- Bevat voorgekookt johannesbroodpitmeel
 - ✓ Verdikt de voeding in zowel zuur als niet zuur milieu¹⁵⁻¹⁷
 - ✓ Vermindert de frequentie en hoeveelheid regurgitatie¹⁸⁻²²
- Bevat postbiotica (dankzij ons unieke Lactofidus fermentatieproces) en onze prebiotische vezelmix scGOS:lcFOS 9:1 met HMO 3'GL voor meer comfort:
 - ✓ Zorgt voor een darmmicrobiota meer in lijn met die van borstgevoede zuigelingen²³
 - ✓ Ontlastingskenmerken meer in lijn met die van borstgevoede zuigelingen²
- Bevat een optimale hoeveelheid ijzer, calcium, fosfor en zink²⁴
- Gemakkelijk te bereiden bij 37°C

A.R. 1: vanaf de geboorte tot 6 maanden

A.R. 2: van 6 tot 12 maanden



Nutrilon Pepti

Dieetvoeding voor de baby met (verdenking van)** koemelkallergie

- Op basis van een intensief wei-eiwidhydrolysaat
- Samenstelling intensief eiwhydrolysaat met lactose heeft de voorkeur volgens verschillende richtlijnen^{25,26}
- Bewezen effectief door onderzoek²⁷ volgens internationale criteria^{28,29}
- Bevat de mix van prebiotische vezels scGOS:lcFOS 9:1
- Bevat lactose voor een bifidogeen effect²⁹
- Betere smaak dan voeding op basis van caseïne hydrolysaat^{30,31}
- Komt voor vergoeding in aanmerking

Pepti 1: vanaf de geboorte tot 6 maanden

Pepti 2: van 6 tot 12 maanden

Melk na 1 jaar



Nutrilon Dreumes- en Peutermelk

Als aanvulling op de dagelijkse voeding van peuters

- Draagt bij aan een gezonde, gevarieerde voeding
- Bevat de mix van prebiotische vezels scGOS:lcFOS 9:1
- Verkleint de kans op een tekort aan ijzer met 58%³²
- Verkleint de kans op een tekort aan vitamine D met 78%³²
- 2 varianten: neutrale en vanille smaak


Dreumesmelk 4: van 1 tot 2 jaar

Peutermelk 5: van 2 tot 3 jaar

Peuterpluismelk 6: van 3 tot 4 jaar

Nutrilon: een passende voeding voor elke baby

Beslisboom*



* De beslisboom is toepasbaar voor niet-premaatuuur geboren baby's
 ** Bij verdenking van koemelkallergie kan Nutrilon Pepti ingezet worden als onderdeel van een dubbelblinde provocatietest met een koemelkeiwiteliminatieperiode.

Vragen of advies over deze voedingen?

Bel gratis 0800 022 80 60 WhatsApp: +31 6 83 65 11 33

De diëtisten van Nutricia voor Professionals staan voor u klaar!
 • 24 uur per dag • 7 dagen in de week

Wilt u meer informatie over de voedingswaarde en samenstelling van deze producten?

Ga naar www.nutriciavorprofessionals.nl/producten OF Scan de QR code met uw smartphone



Referenties: 1. Tims S, et al. *J Pediatr Gastroenterol Nutr.* 2018;66(S2):N-eP-029;949. 2. Rodriguez-Herrera A et al. (2019) *Nutrients* 11(7),1530. 3. Arslanoglu S, et al. (2008) *J Nutr.* 138(6):1091-1095. 4. Bruzzese E, et al. (2009) *Clin Nutr.* 28(2):156-161. 5. Oozeer R, et al. (2013) *Am J Clin Nutr.* 98(suppl):561S-71S. 6. Thibault H, et al. (2004) *J Pediatr Gastroenterol Nutr.* 39:147-152. 7. Arslanoglu S, et al. (2007) *J Nutr.* 137:2420-2422. 8. Bongers ME et al. (2007) *Nutr J.* 6:8. 9. Schmelzle H, et al. (2005) *J Pediatr Gastroenterol Nutr.* 36(3):343-351. 10. Vandenplas Y, et al. (2017) *Acta Paediatr.* 106(7), 1150-1158. 11. Billeaud C et al. (1990) *European Journal of Clinical Nutrition.* 44: 577-583. 12. Savino F et al. (2006) *Eur J Clin Nutr* 60:1304-1310. 13. Savino F et al. (2003) *Acta Paediatr suppl* 91(441),86-90. 14. Schmelzle H et al. (2003) *J Pediatr Gastroenterol Nutr* 36:343-51. 15. Horvath A et al. (2008) *Pediatrics Dec*;122(6):e1268-77. doi: 10.1542/peds. 16. Nutricia Research (1997) Intern report. 17. Abrahamse E et al. (2009) Intern report Nutricia Research. 18. Wenzl TG et al. (2003) *Pediatrics* 111 (4Pt1):e355-9. 19. Vandenplas Y et al. (1994) *Eur J Pediatr Jun*;153(6):419-25. 20. Borrelli O et al. (1997) *Ital J Gastroenterol Hepatol.* Jun;29(3):237-42. 21. Grosse K et al. (1998) *Kinderärztliche Praxis* 69:204-10. 22. Hegar B et al. (2008) *J Pediatr Gastroenterol Nutr* 47:26-30. 23. Tims et al. (2018) *J Pediatr Gastroenterol Nutr* 66:884-5. 24. Levchenko E et al. (1998) *Acta gastroenterol Belg* 61, 285-287S. 25. Fiocchi A et al. (2010) Word Allergy Organization (WAO) Diagnosis and Rationale for Action against Cow's Milk Allergy (DRACMA) guidelines. 26. Koletzko S et al. (2012) *JPGN* 55:221-229. 27. Giampietro PG et al. (2001) *Pediatric Allergy Immunology* 23 420-427. 28. American Academy of Pediatrics (2000) *Pediatrics* 106:346-9. 29. Francavilla R et al. (2012) *Pediatric Allergy Immunol.* 29:857-862. 30. Maslin K, Fox AT, et al. (2018) *Pediatr Allergy Immunol.* 29:857-862. 31. Glas B, (2003) Scientific Services. Intern rapport Nutricia Nederland B.V.32. Akkermans M et al. (2017) *Am J Clin Nutr* 105(2):391-399.

900533 • Borstvoeding is de beste voeding voor baby's. Deze informatie is uitsluitend bestemd voor (para)medici. • Nutricia Nederland B.V. Postbus 445, 2700 AK Zoetermeer Februari 2022

