

125
JAAR

NUTRICIA
ONDERZOEK

Nutrilon® Omneo

Onze **meest geavanceerde dieetvoeding**
bij **krampjes** en **moeizame ontlasting**



Onze **unieke combinatie** van ingrediënten




Hoge tevredenheid bij ouders en kinderartsen¹³



Bewezen effectief, al verbetering na 1 week⁸⁻¹⁰

Heb je vragen of wil je specifieke casuïstiek bespreken?
0800 022 80 60 (24/7) of scan de QR-code en stuur gelijk een whatsappbericht!



Belangrijk: Borstvoeding is de beste voeding. Nutrilon Omneo is een voeding voor medisch gebruik. Dieetvoeding bij krampjes en/of moeizame ontlasting, uitsluitend te gebruiken onder medisch toezicht. Deze informatie is uitsluitend bedoeld voor (para)medici. Nutricia Nederland Postbus 445, 2700 AK Zoetermeer - 177089

Onze unieke combinatie van ingrediënten

ZETMEEL

Minder luchthappen door verdikte consistentie²²

BÈTA-PALMITAAT

Geeft zachtere ontlasting & helpt bij de opname van vet en calcium²³⁻²⁵



Bewezen
effectief

Al verbetering na
1 week⁸⁻¹⁰

VERLAAGD LACTOSEGEHALTE*

Minder flatulentie en darmklachten²⁶



PREBIOTICA SCGOS:LCFOS (9:1)

Zorgt voor een darmmicrobiota vergelijkbaar met borstgevoede baby's^{12,13}

PARTIEEL EIWIDHYDROLYSAAT

Voor een gemakkelijke vertering^{27,28}

* In vergelijking met onze standaard zuigelingenvoeding

²². Horvath A, et al. Pediatrics. 2008;122(6):e1268-77. ²³. Carnielli V, et al. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 1996;23(5):553-60. ²⁴. Havlicekova Z, et al. Nutrition Journal 2016. 2016;15(1):28. ²⁵. Kennedy K, et al. Am J Clin Nutr. 1999 Nov;70(5):920-927. ²⁶. Kanabar D, et al. J Hum Nutr Diet. 2001;14(5):359-63. ²⁷. Billeaud C, et al. Eur J Clin Nutr. 1990;44(8):577-83. ²⁸. Tolia V, et al. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 1992;15(3):297-301.

125
JAAR

NUTRICIA
ONDERZOEK

Nutrilon® Omneo

Een bewezen effectieve
dieetvoeding bij krampjes
en moeizame ontlasting




Maag-darm klachten

Veel ouders willen er alles aan doen om dit **op te lossen**¹¹

Praktische tips:⁶

- ✓ **Flesvoeding?** Zuigelingenvoeding met prebiotica scGOS:lcFOS (9:1)^{12,13}
- ✓ **Buikje masseren**, met de klok mee
- ✓ Met de **beentjes fietsen**
- ✓ **Rustig drinken** (20-30 minuten)
- ✓ **Ouders geruststellen**



Het effect

van **Nutrilon® Omneo**

Na 1 week

- ✓ **58%** vermindering van krampjes en episodes¹²

- ✓ **3x** vaker ontlasting¹³

Bewezen effectief

Al verbetering na **1-2 weken**¹²⁻¹⁴

Na 2 weken

- ✓ **70%** vermindering van huilepisodes⁸


- ✓ **4x** vaker ontlasting⁹

- ✓ **70%** verbetering van maag- & darmklachten¹⁰

Hoge tevredenheid bij **artsen en ouders**¹¹



91% van de **ouders**



95% van de **artsen**

melden een positief effect¹¹

Nutrilon® Omneo

Wordt ondersteund door verschillende **klinische studies**



Bewezen effectief^{8-11,18,19}, onderzoek bij **meer dan 1000 zuigelingen** met krampjes, moeizame ontlasting en gerelateerde symptomen



Klinische studies hebben aangetoond dat de gezondheidsvoordelen van **onze geavanceerde mix prebiotische vezelmix scGOS:lcFOS 9:1** een gezonde darmmicrobiota en zo ook het immuunsysteem ondersteunt¹²⁻¹⁴



Onze prebiotische vezelmix scGOS:lcFOS 9:1 is **gevalideerd in meer dan 40 klinische studies** en beschreven in **meer dan 90 wetenschappelijke publicaties**¹⁵⁻¹⁷



Bewezen effectief gebleken in **5 RCT's** (Randomised Controlled Trials)^{8-10,18,19}



Praktijkervaring vanuit RWE (Real World Evidence) studie met Nutrilon® Omneo¹¹

125 JAAR
NUTRICIA ONDERZOEK



Nutrilon® Omneo 1
van 0 tot 6 maanden



Nutrilon® Omneo 2
vanaf 6 maanden

¹. Ipsos HCP Healthy Paeds Tracker 2020 ². Mahon J, et al. BMJ Open. 2017;7(11). ³. Glanville J, et al. BMJ Open. 2016;6(8):e011475. ⁴. Ferreira-Maia A, et al. World J Gastroenterol. 2016;22:6547-58. ⁵. Steutel F, et al. J Pediatr. 2020; 221:107-114. ⁶. <https://www.icareigz.nl> ⁷. Bellasche M, et al. Acta Paediatr. 2018;107(7):12761282. ⁸. Savino F, et al. Eur J Clin Nutr. 2006;60:1304-1310. ⁹. Savino F, et al. Acta Paediatr. 2005;94(S449): 120-124. ¹⁰. Velt V, et al. Journal für Ernährungsmedizin. 2000; 2 (4). 14-20. ¹¹. Savino F, et al. Acta Paediatr Suppl. 2003;91(441):86-90. ¹². Knol J, et al. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2005;40(1):36-42. ¹³. Moro G, et al. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2002;34(3):291-295. ¹⁴. Scholtens P, et al. World J Gastroenterol. 2014;20(37):13446-13452. ¹⁵. Béghin L, et al. Clin Nutr. 2021;40(3): 778-787. ¹⁶. Salminen S, et al. Nutrients. 2020; 12:1952. ¹⁷. Oozeer R, et al. Am J Clin Nutr. 2013; 98(suppl):561S-71S. ¹⁸. Schmelzle H, et al. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2003;36(3):343-351. ¹⁹. Bongers M, et al. Nutr J. 2007;6:8.