

TOETSVRAGEN

Welkom bij de toets vragen van de module behandeling van dysfagie voor zorgmedewerkers.

Maak de toets om te controleren of je de stof voldoende beheerst. Bij een score van **80% of hoger** beheers je de stof **voldoende**.

Neem bij een score **lager dan 80%** de stof nogmaals door en maak de toets dan **opnieuw**.

De toets kan zo vaak gemaakt worden als nodig is.

Maak na het afronden van de toets een print screen of foto van de score en deel deze met je leidinggevende.

IS ONDERSTAANDE STELLING JUIST OF ONJUIST?

IN HET IDDSI-KADER WORDEN DRANKEN GEMETEN VAN NIVEAU 3 TOT NIVEAU 7.

- Juist
- Onjuist

Onjuist. In het IDDSI-kader worden dranken gemeten van niveau 0 tot en met niveau 4. Voedingsmiddelen worden gemeten van niveau 3 tot en met niveau 7.

ALS IEMAND SLIKPROBLEMEN HEEFT, NAAR WIE MOET JE HEM OF HAAR DAN VERWIJZEN?

- Diabetesverpleegkundige
- Logopedist
- Diëtist

Wanneer iemand slikproblemen heeft moet je hem of haar doorverwijzen naar de logopedist.

HOEVEEL NIVEAUS BEVAT HET IDDSI-KADER?

- 8
- 7
- 6

Het IDDSI-kader bevat 8 niveaus, namelijk van 0 tot met 7.

WAT ZIJN VOORBEELDEN VAN TESTMETHODES OM IDDSI-NIVEAU 0 TOT EN MET NIVEAU 4 (DRANKEN) TE TESTEN ?

- Vorkdruppeltest, lepelkanteltest, mesdruktest
- Vorkdruppeltest, vorkdruktest, lepelkanteltest, spuittest/flow test
- Vorkdruppeltest, lepeldruktest, spuittest/flow test
- Vorkdruppeltest, vorkdruktest, vorkkanteltest

Voorbeelden van testmethodes om IDDSI-niveau 0 t/m 4 te testen zijn de vorkdruppeltest, vorkdruktest, lepelkanteltest en de spuittest/flow test.

DE ROL VAN ZORGMEDEWERKER BINNEN DE DIEETBEHANDELING VAN DYSFAGIE IS HET OBSERVEREN EN SIGNALEREN VAN SLIKPROBLEMEN BIJ PATIËNTEN EN HET ONDERSTEUNEN VAN PATIËNTEN MET CHRONISCHE SLIKPROBLEMEN DOOR HET OPVOLGEN VAN HET EET- EN DRINKADVIES.

Juist

Onjuist

Juist, de rol van zorgmedewerker binnen de dieetbehandeling van dysfagie:

- Observeert en signaleert slikproblemen bij de patiënt.
- Rapporteert de slikproblemen in het patiëntendossier en geeft de problemen door aan de verantwoordelijke verpleegkundige.
- Patiënten nauwlettend observeren tijdens de maaltijden en drankjes om tekenen van slikproblemen of verslikken op te merken.
- Ondersteunt de patiënt met chronische slikproblemen door het opvolgen van het eet- en drinkadvies.

IS ONDERSTAANDE STELLING JUIST OF ONJUIST?

WAT IS DE ROL VAN DE ZORGMEDEWERKER BIJ DE BEHANDELING VAN DYSFAGIE.

Juist

Onjuist

IS ONDERSTAANDE STELLING JUIST OF ONJUIST?

IN HET IDDSI-KADER WORDEN VOEDINGSMIDDELEN GEMETEN VAN NIVEAU 0 TOT MET NIVEAU 4.

- Juist
- Onjuist

Onjuist. Voedingsmiddelen worden gemeten van niveau 3 tot en met niveau 7. Dranken worden gemeten van niveau 0 tot en met niveau 4.