

Bereidingswijze Nutilus Clear



Neem de benodigde hoeveelheid Nutilus en doe dit in een kop, glas of kom



Neem de benodigde hoeveelheid drank, vloeistof of voeding, en voeg dit toe



Meng onmiddellijk gedurende minstens 10 seconden met een vork



Laat 1 minuut staan, roer daarna nog 5 seconden door voor consumptie



Verdikte (heldere) drank, vloeistof of gepureerde voeding

Instructiekaart Nutilus Clear voor in patientendossier



..... Naam van de patiënt



Scan de QR www.nutriciamedical.nl/code voor een instructievideo of kijk op www.nutriciamedical.nl/nutilisclearvideo

Nu met handige halve maat van 1,5 g aan de onderzijde om de dosering nog beter af te stemmen op de individuele behoefte



Gebruiksadvies Nutilus Clear per 200 ml

| Maatschepjes | IDDS-level | Dikte van vloeistof |
|--------------|------------|----------------------|
| 0,5 | 1 |licht vloeibaar |
| 1 | 2 3 |siroop |
| 2 | 3 |vla |
| 3 | 4 |pudding |

Er kunnen verschillen bestaan tussen de bereidingstijd van verschillende soorten dranken en vloeistoffen. Zie op de achterzijde tips om optimaal resultaat te behalen bij verschillende dranken.

Nutilus Clear is voeding voor medisch gebruik bij dysfagie vanaf 3 jaar.

NUTRICIA

Tips voor optimaal resultaat

Warme dranken en vloeistoffen

- Nutilis Clear lost het best op in warme dranken.
- Het gebruik van de shaker wordt niet aanbevolen voor het bereiden van warme dranken i.v.m. de veiligheid tijdens het bereiden.

Koude dranken en vloeistoffen

- Koude dranken en vloeistoffen hebben gemiddeld een langere bereidingstijd dan warme dranken.

Sappen

- (Vruchten)sappen hebben een hoge zuurgraad. Laat na het roeren de drank 2-3 minuten staan voor het beste resultaat.

Koolzuurhoudende dranken

- Roer eerst met een vork het koolzuur uit de drank (voor zover mogelijk) of laat het koolzuur verdwijnen door het uit te schenken in een glas. Bereid daarna uw drank volgens de gebruikelijke aanwijzingen.

Opwarmen van dranken, vloeistoffen en voeding

- Indien gewenst of nodig kunnen verdikte substanties worden opgewarmd in de magnetron.

Verdikken van drinkvoeding

- Het verdikken van drinkvoeding geeft wisselende resultaten. We adviseren daarom het gebruik van Nutilis Complete om de hoogste veiligheid te realiseren.

Adviezen om veiliger te eten en drinken

Wilt u meer informatie of advies? Neem dan contact op met onze diëtisten van Nutricia Medische Voedingsservice: telefoon: 0800-022 33 22 (gratis, op werkdagen van 8.30 tot 17:00 uur)
e-mail: medischevoeding@nutricia.com - internet/chat: www.nutriciamedical.nl

Deze informatie is uitsluitend bestemd voor (para) medici

Artikelcode 900384

Bereidingswijze Nutilus Clear



Neem de benodigde hoeveelheid Nutilus en doe dit in een kop, glas of kom



Neem de benodigde hoeveelheid drank, vloeistof of voeding, en voeg dit toe



Meng onmiddellijk gedurende minstens 10 seconden met een vork



Laat 1 minuut staan, roer daarna nog 5 seconden door voor consumptie



Verdikte (heldere) drank, vloeistof of gepureerde voeding

Instructiekaart Nutilus Clear voor in patientendossier



..... Naam van de patiënt



Scan de QR www.nutriciamedical.nl/code voor een instructievideo of kijk op www.nutriciamedical.nl/nutilisclearvideo

Nu met handige halve maat van 1,5 g aan de onderzijde om de dosering nog beter af te stemmen op de individuele behoefte



Gebruiksadvies Nutilus Clear per 200 ml

| Maatschepjes | IDDS-level | Dikte van vloeistof |
|--------------|------------|----------------------|
| 0,5 | |licht vloeibaar |
| 1 | |siroop |
| 2 | |vla |
| 3 | |pudding |

Er kunnen verschillen bestaan tussen de bereidingstijd van verschillende soorten dranken en vloeistoffen. Zie op de achterzijde tips om optimaal resultaat te behalen bij verschillende dranken.

Nutilus Clear is voeding voor medisch gebruik bij dysfagie vanaf 3 jaar.

Nutilus Complete zijn voedings voor medisch gebruik voor patiënten met ziektegerelateerde ondervoeding met (ver)slikproblemen. Geschikt vanaf 3 jaar.

NUTRICIA

Tips voor optimaal resultaat

Warme dranken en vloeistoffen

- Nutilis Clear lost het best op in warme dranken.
- Het gebruik van de shaker wordt niet aanbevolen voor het bereiden van warme dranken i.v.m. de veiligheid tijdens het bereiden.

Koude dranken en vloeistoffen

- Koude dranken en vloeistoffen hebben gemiddeld een langere bereidingstijd dan warme dranken.

Sappen

- (Vruchten)sappen hebben een hoge zuurgraad. Laat na het roeren de drank 2-3 minuten staan voor het beste resultaat.

Koolzuurhoudende dranken

- Roer eerst met een vork het koolzuur uit de drank (voor zover mogelijk) of laat het koolzuur verdwijnen door het uit te schenken in een glas. Bereid daarna uw drank volgens de gebruikelijke aanwijzingen.

Opwarmen van dranken, vloeistoffen en voeding

- Indien gewenst of nodig kunnen verdikte substanties worden opgewarmd in de magnetron.

Verdikken van drinkvoeding

- Het verdikken van drinkvoeding geeft wisselende resultaten. We adviseren daarom het gebruik van Nutilis Complete om de hoogste veiligheid te realiseren.

Dysfagieproducten bij ziektegerelateerde ondervoeding*

Nutilis Complete Stage 1



Nutilis Complete Stage 2



Nutilis Fruit Stage 3



*Deze producten met voorzichtigheid gebruiken tussen de 3 - 6 jaar.

Adviezen om veiliger te eten en drinken

Wilt u meer informatie of advies? Neem dan contact op met onze diëtisten van Nutricia Medische Voedingsservice: telefoon: 0800-022 33 22 (gratis, op werkdagen van 8.30 tot 17:00 uur) e-mail: medischevoeding@nutricia.com - internet/chat: www.nutriciamedical.nl

Deze informatie is uitsluitend bestemd voor (para) medic

Artikelcode 900384